

Vacunas escolares obligatorias y recomendadas, Indiana 2025-2026



Actualizado 12.11.2024

Grado	Obligatoria	Recomendada
Pre-K	3 hepatitis B 4 DTaP (difteria, tétano y tos ferina) 3 polio	1 varicela 1 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 2 hepatitis A
K a 5.º	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio	2 varicela 2 MMR 2 hepatitis A
De 6.º a 11.º	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio 2 varicela	2 MMR 2 hepatitis A 1 MCV4 (antimeningocócica) 1 Tdap (tétano, difteria y tos ferina)
12	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio 2 varicela	2 MMR 2 hepatitis A 2 MCV4 1 Tdap

HepB: La edad mínima para la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B es 24 semanas de edad.

DTaP: Las cuatro dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la cuarta dosis se administró al cumplir cuatro años o después de esa fecha.

Polio*: Tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis son aceptables para todos los niveles de grado si la tercera dosis se administró al cumplir cuatro años o después de esa fecha y al menos seis meses después de la dosis anterior.

*Para los estudiantes de K hasta 12.º, la dosis final debe administrarse al cumplir cuatro años o después de esa fecha y por lo menos seis meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación del médico sobre el historial de la enfermedad, incluido mes y año, se considera prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar hasta 12.º grado. No se aceptará el informe de los padres sobre el historial de la enfermedad.

Tdap: No hay un intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis al cumplir 16 años o después de esa fecha solo necesitan una dosis de la vacuna MCV4.

Hepatitis A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es seis meses calendario. Se requieren dos dosis para todos los niveles de grado.

Para obtener información adicional sobre las vacunas, visite: [in.gov/health/immunization](https://www.in.gov/health/immunization) o llame al 1 (800) 701-0704 en el horario de atención habitual.